

GOTA-PC® DESCONGESTIVO

TETRAHIDROZOLINA HCl 0,06%

BAÑO OCULAR
SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL

Industria Argentina
VENTA LIBRE

Poen

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN
ANTES DE EMPLEAR EL MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE GOTA-PC® DESCONGESTIVO?

Ingrediente activo: Tetrahidrozolina clorhidrato 0,06% (0,06 gramos / 100 mililitros)

Ingredientes inactivos: Edetato de sodio, Ácido bórico, Borato de sodio, Cloruro de sodio, Cloruro de benzalconio, Agua purificada.

ACCIÓN:

DESCONGESTIVO OCULAR.

¿PARA QUÉ SE USA GOTA-PC® DESCONGESTIVO?

Está indicado para el alivio de la congestión y el enrojecimiento ocular, debidos a una irritación local menor causada por exposición a humo, polvo, corrientes de aire, luz (solar, rayos ultravioletas, televisión), agua clorada, cosméticos y lentes de contacto, entre otras condiciones.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR GOTA-PC® DESCONGESTIVO?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes, padece glaucoma de ángulo abierto o glaucoma de ángulo estrecho.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE EMPLEAR ESTE MEDICAMENTO?

NO inyectar. No ingerir. Este producto es sólo para uso externo.

No utilizar el medicamento después de la fecha de vencimiento indicada.

No utilizar si la solución cambia de color o se enturbia.

Utilizar el producto sólo si el envase se halla intacto.

Para evitar la contaminación del producto, no

poner en contacto el pico del frasco con el ojo o cualquier otra superficie. Cerrar el frasco inmediatamente después de su uso. La utilización de productos contaminados puede causar serios daños oculares, con la consecuente disminución de la visión. Un mismo envase no debe ser utilizado por más de una persona.

Si usted es usuario de lentes de contacto, retirarlas antes del uso del producto y esperar 15 minutos en caso de volver a colocarlas.

Si usted está usando simultáneamente otros colirios, consulte a su médico antes de aplicarse este producto y aguarde 15 minutos entre una aplicación y la otra.

Si usted sufre de hipertensión arterial, diabetes, hipertiroidismo, enfermedades cardiovasculares o arteriosclerosis, no utilice el producto y consulte a su médico. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de emplear este medicamento.

Consultar al médico antes de utilizar este medicamento en niños menores de 6 años.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY EMPLEANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como picazón transitoria luego de la instilación, ardor, visión borrosa, dilatación de la pupila. En estos casos, suspenda el tratamiento.

Este producto puede aumentar la presión intraocular. La sobredosis o el uso prolongado de este producto pueden producir un incremento del enrojecimiento o irritación ocular.

Suspenda el uso del producto y consulte a su médico si aparece dolor ocular, alteración de la visión o si continúa con el ojo rojo o irritado. Si estas condiciones **PERSISTEN POR MÁS DE 3 DÍAS O EMPEORAN** CONSULTE A SU MÉDICO.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

VÍA TÓPICA OFTÁLMICA

Frasco gotero: Colocar 1 ó 2 gotas en el(los) ojo(s) irritado(s) hasta cuatro veces por día.

Baño ocular: 1 ó 2 aplicaciones diarias.

1. Lávese las manos antes de usar el producto.

2. Llene el vaso-medida con la solución.

3. Recline la cabeza hacia adelante y coloque el vaso-medida contra el ojo presionando suavemente.

4. Incline lentamente la cabeza hacia atrás hasta que note que el producto cubre el ojo.

5. Mantenga el producto en contacto con la superficie del ojo y parpadee para favorecer el lavado.

6. Transcurridos unos 30 segundos, incline la cabeza nuevamente hacia delante y retire el vaso-medida.
7. Seque el párpado y las pestañas con un paño limpio.
8. Repita la misma operación en el otro ojo utilizando una nueva cantidad de baño ocular.
9. Al finalizar, lavar y secar cuidadosamente el vaso-medida.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI EMPLEÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez:

(011) 4962-6666 / 2247.

Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:

(011) 4654-6648 / 4658-7777.

FORMA DE CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura menor a 30°C.

Una vez abierto el envase por primera vez, utilizarlo dentro de las 4 semanas.

PRESENTACIÓN:

Frasco gotero: 10 mililitros de solución oftálmica estéril.

Baño ocular: 80 mililitros de solución oftálmica estéril.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Información al consumidor:

Laboratorios POEN: 0800-333-POEN (7636)

www.poen.com.ar

www.gotapc.com.ar

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 9.101.

Director Técnico:

Victor D. Colombari, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: Mayo / 2014.

LABORATORIOS POEN S.A.U.

Bermúdez 1004, C1407BDR

Buenos Aires, Argentina

Elaborado en:

Valentín Torra 4880, Paraná,

Entre Ríos, Argentina.



4063706842

605

C.V. 3 - 7