

**KETIF®****KETOTIFENO 0,025%****SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL**Industria Argentina  
VENTA LIBRE**Poen****LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN  
ANTES DE EMPLEAR EL MEDICAMENTO****¿QUÉ CONTIENE KETIF®?**

**Ingrediente activo:** Ketotifeno 0,025% (0,025 gramos / 100 mililitros) (equivalente a Ketotifeno Fumarato 0,035%).

**Ingredientes inactivos:** Glicerina, Edetato disódico dihidrato, Cloruro de benzalconio, Hidróxido de sodio, Agua purificada.

**ACCIÓN:**  
ANTIALÉRGICO OCULAR.

**¿PARA QUÉ SE USA KETIF®?**

Se usa para el alivio de los síntomas de la alergia ocular (picaazón de los ojos, lagrimeo, párpados rojos o inflamados). KETIF® es un anti-histamínico (previene la liberación de histamina y la activación de células involucradas en la respuesta alérgica).

**¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR KETIF®?**  
NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes.

**¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE  
EMPLEAR ESTE MEDICAMENTO?**

No inyectar. No ingerir.

Consulte a su médico antes de usar KETIF® si:

- Ud. recibe medicamentos para el tratamiento de la depresión o alergia.
- Va a ser administrado a un menor de 3 años de edad.
- Se ha superado la fecha de vencimiento.

Si está en tratamiento por otra enfermedad, si está embarazada o amamantando consulte a su médico antes de usar este medicamento.

**¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY  
EMPLEANDO ESTE MEDICAMENTO?**

- Interrumpa el uso y consulte a su médico si presenta:
- Irritación, dolor o inflamación de los ojos.
  - Visión borrosa, sequedad de los ojos, irritación de los párpados.
  - Fotofobia (aumento de la sensibilidad a la luz).
  - Ojo rojo por dilatación de los vasos conjuntivales.
  - Hemorragias (sangrados) en la parte blanca del ojo.
  - Cefalea (dolor de cabeza)
  - Somnolencia
  - Reacciones alérgicas de la piel como eczemas (picaazón, enrojecimiento, quemazón, hinchazón de la cara y párpados.
  - Sequedad de boca.
  - Aumento de la gravedad de condiciones alérgicas preexistentes como asma y eczema.

**Si los síntomas persisten por más de 3 días o empeoran consulte a su médico.**

Si se usa simultáneamente con otros medicamentos para los ojos, debe haber un intervalo de al menos 5 minutos entre una aplicación y la otra.

No use lentes de contacto si sus ojos están enrojecidos. Evite el contacto de KETIF® con las lentes de contacto blandas. Si utiliza lentes de contacto blandas y no evidencia enrojecimiento ocular, debe retirarse las lentes de contacto antes de la aplicación de KETIF® y esperar al menos 15 minutos antes de volver a colocárselas. El cloruro de benzalconio altera el color de las lentes de contacto blandas.

Debido a que el uso de KETIF® puede afectar la visión temporalmente tras su aplicación, NO debe aplicarlas mientras conduce o manejar maquinaria que requiera agudeza visual.

KETIF® puede aumentar el efecto del alcohol.

**¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?**


Solamente para uso oftálmico.

Se recomienda 1 gota en cada ojo afectado dos veces al día (mañana y tarde), cada 8 a 12 horas.

Para la colocación de la gota:

1. Lávese las manos correctamente antes de manipular el envase o tocarse los ojos.
2. Desenrosque la tapa del frasco gotero.
3. Si utiliza lentes de contacto, retírelas, a menos que su oftalmólogo le haya indicado que se las deje puestas. Inclíne la cabeza ligeramente hacia

- atrás y mire hacia arriba.
4. Baje el párpado inferior con el dedo índice, formando una cavidad o bolsillo ideal para depositar la gota.
5. Sostenga la punta del gotero directamente sobre el bolsillo del párpado.
6. Apriete el envase suavemente y permita que caiga una gota en el bolsillo formado. Mantenga el párpado inferior hacia abajo y parpadee ligeramente. Luego, suelte el párpado y cierre suavemente el ojo durante unos segundos. Con un pañuelo limpio seque el exceso de colirio.
8. Cierre cuidadosamente el frasco gotero luego de utilizarlo.

**¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI  
EMPLÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?**

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica. Centros de toxicología:  
Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez:  
(011) 4962-6666 / 2247.  
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:  
(011) 4654-6648 / 4658-7777.

**¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?**

Laboratorios POEN: 0800-333-POEN (7636).  
Teléfono de ANMAT Responde: 0800-333-1234.  
www.ketif.com.ar

**FORMA DE CONSERVACIÓN:**  
Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 25°C.  
Una vez abierto el envase por primera vez, utilizarlo dentro de las 4 semanas.

**RECORDATORIO:**

Este medicamento es para tratar su condición actual. No lo recomiende a otra persona.

**PRESENTACIÓN:**

Frasco gotero con 5 ml de solución oftálmica estéril.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud. Certificado N° 49.102.

Director Técnico:  
Victor D. Colombari, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: Mayo / 2022.

Elaborado en:  
**LABORATORIOS POEN S.A.U.**  
Bermúdez 1004, C1407BDR  
Buenos Aires, Argentina



4035601842  
609  
C.V. 5 - 27