

LÁGRIMA ARTIFICIAL POEN®

ALCOHOL POLIVINILICO 1,4%

LUBRICANTE Y HUMECTANTE
OFTÁLMICO
SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL

Industria Argentina
VENTA LIBRE

Poen

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE EMPLEAR EL MEDICAMENTO

QUÉ CONTIENE LÁGRIMA ARTIFICIAL POEN®?

Ingrediente activo: Alcohol Polivinílico 1,4% (1,4 gramos / 100 mililitros)

Ingredientes inactivos: Cloruro de sodio, Fosfato monosódico dihidrato; Fosfato disódico anhidro; Cloruro de benzalconio; Agua purificada.

ACCIÓN:

LÁGRIMA ARTIFICIAL POEN® humecta y lubrica el ojo.

PARA QUE SE USA LÁGRIMA ARTIFICIAL POEN®?

Esta indicada para la prevención y alivio de las molestias causadas por irritaciones oculares leves, tales como exposición al viento, al sol o ambientes con alta contaminación (polvo).

QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR LÁGRIMA ARTIFICIAL POEN®?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes.

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE EMPLEAR ESTE MEDICAMENTO?

No inyectar. No ingerir.

No utilizar el medicamento después de la fecha de vencimiento indicada.

No utilizar si la solución cambia de color o se enturbia.

Retirar las lentes de contacto cuando se administra LÁGRIMA ARTIFICIAL POEN® y esperar 15 minutos antes de volver a colocarlas.

Para evitar la contaminación del frasco gotero, no poner en contacto el pico con el ojo o cualquier otra superficie. Cerrar el frasco gotero

inmediatamente después del uso. La utilización de productos contaminados puede causar serios daños oculares, con la subsecuente disminución de la visión.

Si usted esta usando simultáneamente otros colirios, consulte a su médico antes de aplicarse este producto y aguarde 15 minutos entre una aplicación y la otra. Si usted recibe algún otro medicamento, esta embarazada o dando pecho a su bebe, consulte a su médico antes de emplear este medicamento.

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY EMPLEANDO ESTE MEDICAMENTO?

Consulte a su médico si experimenta cualquiera de los siguientes efectos secundarios justo después de instilar las gotas; producción lagrimal incrementada, enrojecimiento ocular, sensación de cuerpo extraño, reacción alérgica ocular, hormigueo a corto plazo, picazón ocular, sensación de ardor.

Suspenda su uso y consulte a su médico si aparece dolor o alteración de la visión. Si la irritación de su ojo **PERSISTE POR MÁS DE 2 DÍAS O EMPEORA CONSULTE A SU MÉDICO.**

CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

En adultos y niños mayores de 12 años se recomienda 1-2 gotas en el(los) ojo(s) afectado(s) cada 6 horas.

QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI EMPLEÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica. Centros de toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:
(011) 4962-6666 / 2247.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Laboratorios POEN: 0800-333-POEN (7636).
Teléfono de ANMAT Responde: 0800-333-1234.

PRESENTACIÓN:

Frasco gotero con 10 mililitros de solución oftálmica estéril.

En la tapa presenta un precinto de seguridad desprendible, unido al cuerpo por medio de puentes. Utilizar el producto sólo si el envase se halla intacto.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

FORMA DE CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C.

Una vez abierto el envase por primera vez, utilizarlo dentro de las 4 semanas.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud. Certificado N° 34.427.

Director Técnico:

Víctor D. Colombari, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: Agosto / 2019

LABORATORIOS POEN S.A.U.

Bermúdez 1004 - C1407BDR Buenos Aires, Argentina
www.poen.com.ar



4081502845
2&2
C.V. 4 - 18

