

DROPSTAR® LC

HIALURONATO DE SODIO 0,4%


Poen

SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL

Industria Argentina  
VENTA BAJO RECETA

**Fórmula:**  
Cada 100 ml de solución oftálmica contiene:  
Hialuronato de sodio 0,40 g  
Fosfato monosódico dihidrato 0,09 g; Fosfato disódico anhidro 0,31 g; Cloruro de sodio 0,73 g; Edetato disódico dihidrato 0,05 g; Agua purificada c.s.p. 100 ml.

**Acción terapéutica:**  
Lubricante y humectante ocular.  
El Ácido Hialurónico se adhiere al epitelio de la córnea, incrementando el tiempo de ruptura de la película lagrimal (BUT, break up time) detectado con Fluoresceína, produciendo un alivio casi instantáneo de los síntomas de ojo seco. La estructura del Ácido Hialurónico se puede comparar a la de una esponja constituida por una estructura de cadenas de polisacáridos con abundante agua atrapada entre estas moléculas. La dilución del Ácido Hialurónico varía la proporción de polisacáridos respecto al agua pero retiene sus propiedades humectantes, lubricantes, adherentes y viscoelásticas. Estas propiedades facilitan la adhesión del Ácido Hialurónico a la superficie de las células, aliviando la irritación ocular en los casos de queratitis sicca.



Código ATC: S01XA20.


**Indicaciones:**  
DROPSTAR® LC está indicado para el alivio de cuadros inflamatorios oculares externos (queratoconjuntivitis sicca) o daño corneal debidos a insuficiente secreción lagrimal o desecación excesiva, a la exposición al viento, al sol o a sustancias irritantes. Lubricante y humectante ocular para el tratamiento del Síndrome de Ojo Seco.  
DROPSTAR® LC difiere de las lágrimas multidosis habituales en que es libre de conservante (LC). Los conservantes pueden provocar serias reacciones alérgicas e inflamatorias en los ojos con el uso a largo plazo en condiciones crónicas, como lo es el Ojo Seco. Los colirios sin conservantes, en cambio, permiten preservar la integridad de la superficie ocular. Por esta razón DROPSTAR® LC está recomendado en pacientes con ojos sensibles, y en usuarios de todo tipo de lentes de contacto.

**Características farmacológicas / Propiedades:**  
**Acción farmacológica**  
El Ácido Hialurónico es obtenido por fermentación de una cepa seleccionada de Streptococcus zooepidemicus, una subespecie del Streptococcus equi bacterian.  
El Ácido Hialurónico es un glicosaminoglucano (mucopolisacárido lineal) que se halla en la naturaleza (es un biopolímero) y es un importante componente estructural de casi todas las matrices extracelulares (tejido conectivo intercelular) de los animales vertebrados. Está formado por un número elevado de unidades de N-acetil-D-glucosamina y Ácido D-glucurónico repetidas. En el cuerpo humano es encontrado en el humor acuoso, cuerpo vítreo, cordón umbilical, líquido sinovial y piel. Es el principal constituyente del líquido sinovial contribuyendo notoriamente a la nutrición y lubricación de la superficie del cartilago articular. El Ácido Hialurónico interactúa con otros proteoglicanos que proveen de estabilidad y elasticidad a las matrices extracelulares de todos los tejidos. Esta red de

macromoléculas regula la hidratación del tejido y el movimiento de sustancias en el interior de los compartimentos intersticiales. La acción del Ácido Hialurónico puede ser atribuida a esta especie de estructura tipo esponja formada por la cadena de polisacáridos la cual retiene agua. Las moléculas de agua absorbidas se liberan a partir de la esponja de Ácido Hialurónico a una velocidad más lenta. En consecuencia, se considera al Ácido Hialurónico como un agente de absorción y retención de agua. El Ácido Hialurónico tiene así excelentes propiedades viscoelásticas, posee un relevante rol mecánico (lubricante), humectante y biológico, en el desarrollo y cicatrización de heridas y en procesos inflamatorios tisulares.

LIBRE DE CONSERVANTE - NUEVO ENVASE OFTÁLMICO LC

DROPSTAR® LC se presenta en frasco gotero OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser, Preservative-Free Multidose System), especialmente diseñado para formulaciones oftálmicas Libres de Conservantes (LC), el cual consiste en un sistema de filtración que impide la contaminación del contenido del envase al filtrar el aire que ingresa al frasco durante su uso. Al presionar envase, la presión obliga al sello de cierre a abrirse, permitiendo la formación de la gota. Al mismo tiempo, el flujo de aire para equilibrar presiones dentro del sistema es forzado a pasar a través de un filtro estéril (0,2 µm), frenando el ingreso de partículas y microorganismos, evitando así la contaminación del producto y prolongando la vida útil del mismo una vez abierto el envase.



Este novedoso sistema permite la dosificación de fórmulas oftálmicas sin conservantes, evitando la irritación y citotoxicidad que puede ser producida por el uso prolongado de los conservantes tradicionales, representando significativos beneficios para los pacientes con patologías que requieren tratamiento crónico, como lo es el Ojo Seco.

**Estudios clínicos**  
Los resultados de cuatro estudios abiertos que evaluaron la solución oftálmica de Ácido Hialurónico libre de conservante en 134 niños y adultos durante 2 semanas a 2 meses, para el tratamiento del Síndrome del Ojo Seco de distinta etiología incluyendo uso de lentes de contacto, trabajo de oficina intenso, infección ocular por adenovirus, posmenopausia, blefaritis meibomiana persistente, Síndrome de Sjögren, facoemulsificación con implante de lente intraocular y cirugía refractiva, demostraron que la solución oftálmica de Ácido Hialurónico libre de conservante resultó en una marcada mejoría de los signos y los síntomas del Síndrome del Ojo Seco, proporcionando un alivio rápido y seguro, y mejorando las medidas objetivas (test de Schirmer, prueba de Nom, citología de impresión y biomicroscopía, tinción y osmolaridad lagrimal). También se informó de mayores beneficios en comparación con lubricantes conteniendo conservantes como Cloruro de Benzalconio, incluyendo un inicio más rápido de acción y mejor tolerabilidad.

En otro estudio realizado en 240 voluntarios sanos (480 ojos) sin anomalías de la superficie ocular, se analizaron los efectos de la instilación de ocho sustitutos lagrimales sobre la estabilidad de la película preorneal (siete sustitutos con conservantes y un sustitutos sin conservantes). Se evaluó el tiempo de ruptura lagrimal (BUT) 20 minutos después de la instilación del lubricante. Los resultados mostraron que el valor de BUT obtenido con lubricante sin conservante fue significativamente mayor BUT al obtenido con los lubricantes con conservante (BUT=25 vs. BUT<18 en todos los casos, respectivamente).

Varios estudios controlados realizados en voluntarios sanos y pacientes, a corto y largo plazo, han demostrado que los colirios sin conservante son mejor tolerados por la superficie corneal que los colirios con conservante, resultando menos citotóxicos con respecto al epitelio corneal, menos dañinos con respecto a la película lagrimal y, además, reducen de forma significativa los síntomas referidos por los pacientes, proporcionando una mayor comodidad de uso.

**Posología y Modo de administración:**  
Via de administración: USO TOPICO OFTÁLMICO.  
Como posología orientativa, se recomienda instilar 1 ó 2 gotas en el(los) ojo(s) afectado(s) 3 veces por día, o según prescripción médica. Según la necesidad de cada paciente se decidirá la frecuencia de aplicación. Dado que la formulación es libre de conservantes, puede usarse tantas veces como el paciente lo necesite.  
**Forma de administración:** inclinar el frascogotero hacia abajo, presionarlo, y administrar la dosis en la conjuntiva.

**Contraindicaciones:**  
DROPSTAR® LC está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquiera

de los componentes de su fórmula.

Advertencias:

No inyectar. No ingerir.  
En caso de presentarse dolor en el (los) ojo(s) tratado(s), irritación o cambios en la visión, o si la condición empeora o persiste más de 72 horas, suspender el uso del producto y consultar a su médico.  
Si la solución cambia de color o se enturbia, no lo utilice.  
Utilizar el producto sólo si el envase se halla intacto.  
No utilizar el medicamento después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.  
Es aconsejable evitar el uso simultáneo de soluciones detergentes o antisépticas.

Precauciones:

El producto es envasado en condiciones estériles. Para prevenir la contaminación del pico del frasco gotero, se debe evitar tocar con el envase párpados, pestañas y zonas adyacentes del ojo, o cualquier otra superficie. El manipuleo incorrecto del frasco gotero puede causar la contaminación del pico por bacterias que comúnmente provocan infecciones oculares; y luego causar serios daños oculares, con la subsecuente disminución de la visión. El frasco debe cerrarse inmediatamente después de cada instilación.

**Carcinogénesis - Mutagénesis - Trastornos de la fertilidad**

No existen evidencias hasta el momento.

**Embarazo**

No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Ya que los estudios efectuados en reproducción animal no siempre predicen las respuestas en los seres humanos. DROPSTAR® LC sólo debe usarse en el embarazo si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial para el feto.

**Lactancia**

No se ha establecido si el Hialuronato de Sodio es excretado en la leche humana, por lo tanto se debe actuar con precaución cuando DROPSTAR® LC es administrado en una mujer que amamanta.

**Empleo en pediatría**

La seguridad y eficacia de DROPSTAR® LC en pacientes pediátricos no han sido establecidas.

**Empleo en geriatría**

No se han observado diferencias clínicas en la seguridad y eficacia de DROPSTAR® LC entre la población de edad avanzada y otros pacientes adultos.

**Interacciones medicamentosas**

No existen evidencias de la interacción con otros medicamentos. En caso de administrarse simultáneamente con otros colirios, deberán efectuarse las instilaciones con un intervalo de 15 minutos entre una y otra aplicación, usando preferentemente DROPSTAR® LC último, dada la capa protectora que forma sobre la superficie ocular.

**Reacciones adversas:**

En raros casos se ha observado una fugaz disminución de la visión a la instilación, que es debida a la densidad de la solución, este efecto desaparece rápidamente.  
Es posible observar en algún raro caso, intolerabilidad (quemazón o irritación) sin consecuencias ulteriores, que no requiere modificación del tratamiento.

**Sobredosificación:**

No se han reportados casos en que haya habido sobredosis no tratadas.  
Ante la eventualidad de una ingestión accidental, solicitar asistencia profesional y concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los siguientes Centros de toxicología:  
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247.  
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

**Presentación:**

Frasco gotero conteniendo 10 ml de solución oftálmica estéril.

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

*"Lea con cuidado esta información antes de utilizar este medicamento. Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a leerlo. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. Este medicamento se le ha recetado sólo a usted; no lo administre (o recomiende) a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlos. Esta información no reemplaza el hablar con su médico acerca de su enfermedad o el tratamiento. Este medicamento debe ser indicado por su médico y prescripto bajo una receta médica. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto no deseado no mencionado en este prospecto, informe a su médico o a su farmacéutico".*

¿QUÉ ES Y PARA QUE SE USA DROPSTAR® LC?

DROPSTAR® LC es un lubricante y humectante ocular.

CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE USAR DROPSTAR® LC

- Si es alérgico a alguno de los componentes de la fórmula.  
- Si está embarazada o en período de lactancia, dado que no se han realizado estudios adecuados y bien controlados sobre la eficacia y seguridad DROPSTAR® LC en mujeres embarazadas

y en período de lactancia.  
- Ante su empleo en niños, dado que la seguridad y eficacia de DROPSTAR® LC en estos pacientes no ha sido establecida.

¿QUÉ PERSONAS NO DEBEN USAR DROPSTAR® LC?

Pacientes alérgicos a alguno de los componentes de la fórmula.

USO APROPIADO DEL MEDICAMENTO:

Para uso tópico oftálmico solamente.

¿CUÁNTO, CUÁNDO Y CÓMO SE USA DROPSTAR® LC?

DROPSTAR® LC está indicado para el alivio de cuadros inflamatorios oculares externos (queratoconjuntivitis sicca) o daño corneal debidos a insuficiente secreción lagrimal o desecación excesiva, a la exposición al viento, al sol o a sustancias irritantes. Lubricante y humectante ocular para el tratamiento del Síndrome de Ojo Seco.

DROPSTAR® LC difiere de las lágrimas multidosis habituales en que es libre de conservante (LC). Los conservantes pueden provocar serias reacciones alérgicas e inflamatorias en los ojos con el uso a largo plazo en condiciones crónicas, como lo es el Ojo Seco. Los colirios sin conservantes, en cambio, permiten preservar la integridad de la superficie ocular. Por esta razón, DROPSTAR® LC está recomendado en pacientes con ojos sensibles, y en usuarios de todo tipo de lentes de contacto.

Se recomienda instilar 1 ó 2 gotas en el(los) ojo(s) afectado(s) 3 veces por día, o según prescripción médica. Según la necesidad de cada paciente se decidirá la frecuencia de aplicación. Dado que la formulación es libre de conservantes, puede usarse tantas veces como el paciente lo necesite.

**Forma de administración:** Inclinar el frasco gotero hacia abajo, presionarlo, y administrar la dosis en la conjuntiva.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

Utilizar el producto sólo si el envase se halla intacto.  
No utilizar el medicamento después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.  
El producto es envasado en condiciones estériles. Para prevenir la contaminación del pico del frasco gotero, se debe evitar tocar con el envase párpados, pestañas y zonas adyacentes del ojo, o cualquier otra superficie. El manipuleo incorrecto del frasco gotero puede causar la contaminación del pico por bacterias que comúnmente provocan infecciones oculares; y luego causar serios daños oculares, con la subsecuente disminución de la visión. El frasco debe cerrarse inmediatamente después de cada instilación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En caso de administrar DROPSTAR® LC simultáneamente con otros colirios, deberán efectuarse las instilaciones con un intervalo de 15 minutos entre una y otra aplicación, usando preferentemente DROPSTAR® LC último, dada la capa protectora que forma sobre la superficie ocular.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

En raros casos se ha observado una fugaz disminución de la visión a la instilación, que es debida a la densidad de la solución, este efecto desaparece rápidamente.  
Es posible observar en algún raro caso, intolerabilidad (quemazón o irritación) sin consecuencias ulteriores, que no requiere modificación del tratamiento.

RECORDATORIO

Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas.

Condiciones de conservación:

Conservar a temperatura ambiente desde (5°C - 25°C). Proteger de la luz.

Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción y vigilancia médica y no puede repetirse sin nueva receta médica.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud. Certificado N° 47.188.

Director Técnico:  
Víctor D. Colombari, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: Agosto / 2019.

Información al Consumidor

☎ 0800-333-7636

LABORATORIOS POEN S.A.U.  
Bermúdez 1004 - C1407BDR Buenos Aires, Argentina  
www.poen.com.ar



|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   | <p><b>SURCAN S.R.L.</b><br/>Alvarez Thomas 198 3°A<br/>Buenos Aires - C1427CCO<br/>Tel/Fax: 4553-2422<br/>disenografico@surcan.com.ar<br/>www.surcan.com.ar</p> | <p>Laboratorio/Laboratory: <b>LABORATORIOS POEN</b></p>   | <p><b>Tamaño/Size:</b><br/><b>ancho/width:</b> 150 mm<br/><b>alto/high:</b> 180 mm</p> | <p>Fecha/Date: <b>10/SEP/19</b><br/>Version N°: <b>1</b></p> |
|   | <p>País/Country: <b>ARGENTINA</b></p>   | <p>N° Material: <b>4031110840</b><br/>Pharmacode N°: <b>664</b><br/>Código visual/Visual code: <b>3 - 9</b></p> | <p><b>Guía de colores/Colours Guide</b><br/>Pantone Black C</p>                        |  |
| <p>Elemento/Item: <b>PROSPECTO (FRENTE Y DORSO)</b></p> |   | <p>Colores/Colours: <b>1</b></p>  |  |  |

